



## PROTOCOLO PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO

<b>EXAMEN</b>	<b>AYUNO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Acido Úrico	Opcional	Evitar el consumo de alcohol, ejercicio, el consumo de carnes rojas, viseras y frijoles.
Astos	Si	
Antígeno de S Hepatitis B	Si	
Bilirrubinas	No	
BX para TBC	Opcional	Se debe tomar generalmente la primera expectoración de la mañana. Cuando se pide seriado son tres muestras una por día.
Colesterol HDL	Si	
Colesterol LDL		
Colesterol Total	Mínimo 12 horas	No ingerir alcohol 24 horas previas al examen.
Coprológico	No	Recoger la muestra y entregar en el laboratorio antes de 2 horas.
Creatinina	No	
Cuadro Hemático	No	
Curva de Tolerancia a la Glucosa	Si	
Prueba de Embarazo	No	
Factor R.H	Si	
Anti CDE	No	
Frotis Uretral / Vaginal	No	No haber tenido relaciones sexuales 3 días antes, ni aplicarse óvulos y/o cremas vaginales 5 días antes del examen, ni realizarse duchas vaginales el día del examen.
Glicemia Post	No	
Glucosa	Mínimo 6 horas, máximo 12 horas	
Hematocrito	No	
Hemoclasificación	No	
Hemoglobina	No	
Hemoglobina glicosilada	Si	
Hemoparásitos	No	Se realiza una Punción capilar.
Hongos (KOH ex dto.)	No	No aplicarse crema en el lugar de la lesión. Si el examen es en las uñas no se debe aplicar ningún



		esmalte.
Micro albúmina	No	Ninguna
Morfología globular / FSP	No	Punción capilar, extendido por duplicado
Nit. Ureico Bun	No	
Parcial de Orina	No	Recoger preferiblemente la primera orina de la mañana, tomándola luego del baño de los genitales y hacia la mitad de la micción. Llevarla al laboratorio antes de los 45 minutos luego de recogida la muestra.
Plaquetas Rto.	No	
Proteína C Reactiva	Si	
Sangre Oculta	No	No consumir carnes rojas, evitar consumir remolacha o tomate tres días previos al examen. Llevar la muestra al laboratorio antes de 2 horas de su recolección.
Serología	Si	
Sida AC VIH 1-2	No	
Toxo IgG	Si	Tubo SST según el caso
Toxo IgM	Si	
Transaminasa Oxalac	No	
Transaminasa Piruvi	No	
Triglicéridos	Si	
Troponina	No	
TSH Neonatal	No	
Velocidad de Sedimentación Globular	No	
FTA	Si	
Cultivo FG / BX	Si	
Coproscópico	No	Recoger la muestra y llevarla al laboratorio antes de 2 horas.
Tes. E O'Sullivan	Si	